

KREBSFRÜHERKENNUNG ZYTOLOGIE UND HPV

ABRECHNUNG GKV		
präventiv		
↓	↓	↓
20–29 Jahre	30–34 Jahre	ab 35 Jahre
Primärscreening	Primärscreening	Primärscreening
Testung alle 12 Monate	Testung alle 12 Monate	Testung alle 3 Jahre
Muster-39-Schein	Muster-39-Schein	Muster-39-Schein
Kreuz bei:	Kreuz bei:	Kreuz bei:
<input checked="" type="checkbox"/> 20–29 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> Primärscreening <input checked="" type="checkbox"/> Zytologie	<input checked="" type="checkbox"/> 30–34 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> Primärscreening <input checked="" type="checkbox"/> Zytologie	<input checked="" type="checkbox"/> ab 35 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> Primärscreening <input checked="" type="checkbox"/> Ko-Testung (Zyt.+HPV)

ABRECHNUNG GKV	ABRECHNUNG PRIVAT
kurativ	GOÄ
↓	↓
Infektionsverdacht* / Kontrollunters.	
einmal im Behandlungsfall	
AO-Schein Muster-6 Begutachtungsauftrag Gynäkologische Zytologie/ Histologie	AO-Schein (IGeL/PRIVAT) Begutachtungsauftrag Gynäkologische Zytologie/ Histologie

* Zustand nach operativem/n Eingriff/en an der Cervix uteri wegen einer zervikalen intraepithelialen Neoplasie und/oder einem Zervixzytologiebefund ab Gruppe II-p/g oder IIID1 nach Münchner Nomenklatur III und/oder positivem HPV-Nachweis frühestens nach 6 Mon. zur Kontrolle

ABKLÄRUNGSDIAGNOSTIK ZYTOLOGIE UND HPV

ABRECHNUNG GKV			
Abklärungsdiagnostik 20 – 34 Jahre			
↓	↓		↓
Pap I	Pap II-p/g od. IIID1		Pap III-p/g od. ≥ IIID1
	20–29 Jahre	30–34 Jahre	
	Zytologie alle 6–12 Monate (längstens 24 Monate)	HPV-Test nach 6–12 Monaten	
	Muster-39-Schein	Muster-39-Schein	
	↓	↓	
	Pap I	negativ positiv	
	↓	↓	
	↓	↓	
jährl. zytol. Screening	Kolposkopie innerh. von 3 Monaten	jährl. zytol. Screening	Kolposkopie innerh. von 3 Monaten **
M-39-Schein	M-6-Schein ***	M-39-Schein	M-6-Schein ***

ABRECHNUNG GKV			
Abklärungsdiagnostik ab 35 Jahre			
↓	↓	↓	↓
HPV negativ + Pap I od. II-p/g	HPV negativ + Pap IIID1	HPV positiv + Pap I	HPV positiv + Pap II-p/g od. IIID1
	KO-Testung nach 12 M.	KO-Testung nach 12 M.	
	Muster-39-Schein	Muster-39-Schein	
	↓	↓	
	HPV negativ und Pap I	HPV positiv od. > Pap II-p	
	↓	↓	
	↓	↓	
Screening alle 3 Jahre KO-Testung		Kolposkopie innerh. von 3 Monaten **	
M-39-Schein		M-6-Schein ***	

** Bei einem Zytologiebefund Pap IV oder V soll unverzüglich eine Abklärungsdiagnostik erfolgen.

*** Bitte notieren Sie auf diesem Muster-6-Schein: „Kolposkopie im Rahmen der Abklärungsdiagnostik gemäß oKFE-RL“

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung; Abklärungsdiagnostik für auffällige Befunde im Rahmen der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL), Stand: Januar 2020