

PRÄANALYTIK MIKROBIOLOGIE

NASENABSTRICH

NASOPHARYNGEALABSTRICH



INDIKATOREN

- › Screeninguntersuchungen zum Nachweis von Keimträgertum z. B. MRSA
- › Ggf. nasale Läsionen
- › Verdacht auf Pertussis
- › Verdacht auf Infektionen der oberen Atemwege mit viralen und atypischen Erregern

MATERIALGEWINNUNG

- › Abstrich vom Vestibulum nasi unter Drehen des Tupfers

Bei Verdacht auf Pertussis

- › PCR aus Nasopharyngealabstrich (den Abstrichtupfer unter Sicht bis zum Nasopharynx vorschieben und mehrfach drehen)

Bei Verdacht auf Atemwegsinfektionen durch Viren oder atypische Erreger (Chlamydien, Mykoplasmen)

- › PCR aus Nasopharyngealabstrich (siehe Pertussis)

- › Lagerung bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)

Intraoperativer Abstrich | intraoperatives Material

- › Gewebe, Biopsiematerial oder Eiter nativ in sterilenm Gefäß (steriler Spritze) einsenden oder wenn möglich einen Teil des Materials in eine Blutkulturflasche einimpfen **(NICHT IN FORMALIN EINLEGEN)**
- › **Alternativ** Material aus Randbezirken und Wundgrund mit einem sterilen Abstrichtupfer entnehmen und Tupfer in Transportmedium überführen

- › Lagerung › natives Material bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)
 - › Material in der BK-Flasche bei Raumtemperatur

SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

Folgende Anforderungen/Diagnosen oder Verdachtsfälle bitte extra vermerken

- › Screeninguntersuchungen zum Nachweis von
- › Keimträgertum z.B. mit MRSA

